


---

# CÁNCERES UROLÓGICOS MENOS FRECUENTES

## Cáncer de pene

### ¿QUÉ ES EL CÁNCER DE PENE?

El **cáncer de pene** es poco frecuente, y suele aparecer en hombres no circuncidados (es decir, que conservan el prepucio). Generalmente aparece en el glande o el prepucio, como una masa. Aunque en ocasiones se realiza una biopsia de confirmación, en otras se indica directamente la cirugía.



### ¿CUÁLES SON LOS TRATAMIENTOS QUE SE UTILIZAN?

El tratamiento consiste en la extirpación de la lesión. En función de la localización y agresividad del tumor, se puede extirpar únicamente el tumor, una porción del pene o incluso la totalidad del mismo. En ocasiones es preciso quitar también los ganglios linfáticos inguinales.

## Cáncer de retroperitoneales



### ¿QUÉ ES EL CÁNCER DE RETROPERITONEALES?

El retroperitoneo es una cavidad situada por detrás de las vísceras abdominales. En este espacio, junto a los “grandes vasos” (la aorta y la vena cava) pueden aparecer tumores que requieren un tratamiento quirúrgico. Son tumores poco frecuentes y habitualmente se diagnostican por casualidad, al realizar una prueba de imagen por otro motivo. En ocasiones, debido a su gran tamaño, pueden comprimir otros órganos y dar diversos síntomas.

# Cáncer de testículos

### ¿QUÉ ES EL CÁNCER DE TESTÍCULOS?

El **cáncer de testículo** es un tumor poco frecuente si analizamos la población en conjunto. No obstante, dado que suele afectar a hombres jóvenes, si analizamos sólo este grupo de pacientes, su importancia no se debe subestimar.

Los síntomas de este tipo de cáncer no se deben confundir una masa en el testículo propiamente dicho, ya que se suele presentar como una masa indolora. Además estos síntomas suelen aparecer en hombres de menos de 35 años.



### ¿CUÁLES SON LOS TRATAMIENTOS QUE SE UTILIZAN?

El tratamiento del cáncer de testículo consta de:

- **Cirugía:** el tratamiento básico del tumor testicular es la extirpación del testículo afecto (Orquiectomía). Esta intervención se realiza a través de una pequeña incisión en la ingle. En ocasiones se requiere la extirpación de los ganglios linfáticos.
- **Quimioterapia.**
- **Radioterapia.**

### ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

El cáncer de testículo se debe diagnosticar y operar con prontitud. Por ello en el Hospital de Manises disponemos de un circuito de alta resolución para realizar las pruebas pertinentes en muy poco tiempo.

- Exploración física.
- Ecografía testicular.
- TC tóraco-abdominopélvico: se debe buscar la existencia de enfermedad tumoral "a distancia", es decir, en otros órganos.
- Analítica de sangre con marcadores tumorales.